О.А. Семкина ✉
О.М. Белошапкина

Технология получения и оценка качества микрокапсул сухого экстракта травы зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР)
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
ул. Грина, д. 7, стр. 1, Москва, 117216, Российская Федерация

✉ Семкина Ольга Александровна; semkina@vilarnii.ru

РЕЗЮМЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ. Гигроскопичность и низкая сыпучесть субстанции являются одной из проблем при производстве лекарственных препаратов на основе растительных экстрактов. Микрокапсулирование сухих экстрактов позволяет снизить их гигроскопичность, улучшить характеристики сыпучести и расширить область применения таких субстанций. Сравнительный анализ качества полученных микрочастиц в зависимости от выбранного метода микрокапсулирования необходим для последующей разработки лекарственных препаратов.

ЦЕЛЬ. Апробация разработанной ранее технологии получения микрокапсул и оценка качества микрочастиц сухого экстракта травы зюзника европейского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлся сухой экстракт травы зюзника европейского, обладающий тиреостатическим действием. Микрокапсулирование проводилось методом диспергирования. Для формирования оболочек микрокапсул использован пленкообразователь – желатин марки П-11. Оценка характеристик полученных микрокапсул выполнена в соответствии с фармакопейными показателями качества: размер частиц, влажность, сыпучесть. Качественный и количественный анализ сухого экстракта травы зюзника европейского проводился методами тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Подобраны оптимальные соотношения сухого экстракта, вспомогательных веществ и способа их введения при микрокапсулировании. Полученные микрокапсулы представляют собой однородные частицы размером 50–300 мкм с влажностью $3,21 \pm 0,12\%$ и хорошей сыпучестью. Эффективность инкапсулирования при использовании метода диспергирования достигает $95,0 \pm 1,3\%$. Микрокапсулированные частицы экстракта в отличие от сухого экстракта обладают сферической формой, гладкой поверхностью и улучшенными технологическими показателями.

ВЫВОДЫ. Разработана технология микрокапсулирования сухого экстракта травы зюзника европейского. Результаты проведенных исследований подтвердили эффективность применения метода микрокапсулирования для снижения гигроскопичности сухого экстракта травы зюзника европейского и повышения его стабильности в процессе хранения, что позволяет оптимизировать дальнейшую разработку лекарственных форм.

Ключевые слова: микрокапсулирование; микрокапсулы; сухой экстракт; зюзник европейский; технология инкапсулирования; показатели качества микрочастиц

Для цитирования: Семкина О.А., Белошапкина О.М. Технология получения и оценка качества микрокапсул сухого экстракта травы зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.). *Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств.* 2024;14(1):72–80. <https://doi.org/10.30895/1991-2919-2023-575>

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (номер государственного учета НИР в системе ЕГИСУ НИОКР № FGUU-2022-0011).

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Olga A. Semkina ,
Olga M. Beloshapkina

Production Technology and Quality Assessment of Microcapsules of *Lycopus europaeus* L. Herb Dry Extract

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR),
7/1 Grin St., Moscow 117216, Russian Federation

✉ Olga A. Semkina; semkina@vilarnii.ru

ABSTRACT

SCIENTIFIC RELEVANCE. The high hygroscopicity and poor flowability of herbal extracts complicate the manufacturing of medicinal products based on these active substances. Microencapsulation of dry herbal extracts reduces their hygroscopicity, improves their flowability, and expands their applicability. Further development of medicinal products based on herbal extracts requires a comparative analysis of the relationships between the quality of microparticles and the selected microencapsulation method.

AIM. This study aimed to conduct a practical evaluation of a previously developed microcapsule production technology and to evaluate the quality of a microencapsulated dry extract of *Lycopus europaeus* L. herb.

MATERIALS AND METHODS. The study analysed a dry extract of *Lycopus europaeus* herb with a thyrostatic effect, which was microencapsulated by dispersion. A film-forming agent was used to form the microcapsule shells (gelatine, grade P-11). The microcapsules were characterised by the following pharmacopoeial quality parameters: particle size, moisture content, and flowability. The qualitative and quantitative analysis of the dry extract of *Lycopus europaeus* herb used thin-layer chromatography and spectrophotometry.

RESULTS. The study identified the optimum ratios for *Lycopus europaeus* herb dry extract and excipients as well as the procedure for ingredient addition during the microencapsulation process. The resulting microcapsules were homogeneous particles with a diameter of 50–300 µm, a moisture content of 3.21±0.12%, and a good flow. The encapsulation efficiency of the dispersion method reached 95.0±1.3%. In contrast to non-encapsulated dry extract particles, the particles of microencapsulated *Lycopus europaeus* herb dry extract had a spherical shape, smooth surface, and improved technological properties.

CONCLUSIONS. The authors developed a microencapsulation technology for *Lycopus europaeus* herb dry extract. The study results confirmed the efficiency of the microencapsulation method in reducing the hygroscopicity of *Lycopus europaeus* herb dry extract, increasing its stability during storage, and optimising the further development of dosage forms.

Keywords: microencapsulation; microcapsules; dry extract; *Lycopus europaeus*; microencapsulation technology; microparticle quality parameters

For citation: Semkina O.A., Beloshapkina O.M. Production technology and quality assessment of microcapsules of *Lycopus europaeus* L. herb dry extract. *Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products. Regulatory Research and Medicine Evaluation.* 2024;14(1):72–80. <https://doi.org/10.30895/1991-2919-2023-575>

Funding. The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project of the All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR) registered in the Unified State Information System for Recording the Research, Development, and Technological Works for Civil Purposes under R&D reporting No. FGUU-2022-0011.

Disclosure. The authors declare having no conflict of interest requiring disclosure in this article.

Введение

В условиях повышенного интереса к отечественному лекарственному растительному сырью¹ и лекарственным препаратам растительного происхождения актуальными являются поиск и разработка методов производства, способствующих сохранению физико-химических и технологических свойств субстанций, в том числе сухих экстрактов. Сухие экстракты растительного происхождения характеризуются широким спектром фармакологической активности, хорошей переносимостью и низкой вероятностью возникновения побочных эффектов [1].

В Центре химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР получен и стандартизован сухой экстракт травы зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.). Биологически активные вещества (розмариновая, кофейная, литоспермовая кислоты, инозид, лютеолин, эпигенин и др.), содержащиеся в экстракте зюзника европейского, оказывают выраженное тиреостатическое действие. По данным литературы, при введении в желудок лабораторных животных экстракт зюзника европейского оказывает седативный эффект и дозозависимое гипотиреоидное действие, связанное в основном с присутствием в экстракте розмариновой кислоты [2, 3].

Определение токсикологической характеристики экстракта, проведенное на мышах линии BALB/c и крысах Wistar обоего пола, показало, что фармацевтическая субстанция относится к классу малотоксичных веществ в соответствии с классификацией веществ по ГОСТ 12.1.007-76² [4].

Одной из проблем производства лекарственных препаратов на основе растительных экстрактов является гигроскопичность и низкая сыпучесть субстанции. Микрокапсулирование сухих экстрактов позволяет снизить гигроскопичность, улучшить характеристики сыпучести и расширить область применения полученных субстанций.

Существует более десяти методов микрокапсулирования, применяющихся для получения микрочастиц субстанций растительного происхождения: диспергирование, ионное гелеобразование, коацервация, распылительная сушка и др. [5, 6]. Для получения микрокапсул могут быть использованы не только отдельные методы, но и их комбинации, например последовательное применение методов диспергирования

и распылительной сушки или метода коацервации совместно с лиофильной сушкой [7, 8].

Цель работы – апробация разработанной ранее технологии получения микрокапсул и оценка показателей качества микрочастиц сухого экстракта травы зюзника европейского.

Задачами исследования были получение микрокапсулированной формы экстракта травы зюзника европейского и оценка качества полученных частиц по показателям: влажность, подлинность, размер частиц, сыпучесть, угол естественного откоса, насыпная плотность.

Материалы и методы

Сухой экстракт травы зюзника европейского – аморфный порошок от светло-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, специфического запаха. Для сухого экстракта характерна гигроскопичность и низкая сыпучесть. Сухой экстракт представлен частицами различной формы и размера, а именно: пластинами, параллелепипедами, овалами с неровными краями и шероховатой поверхностью. Размеры таких частиц варьируют от 10 до 100 мкм. Количественное содержание суммы фенольных соединений в пересчете на розмариновую кислоту в сухом экстракте составляет $7,2 \pm 0,4\%$. Сухой экстракт травы зюзника европейского растворим в воде очищенной, спирте этиловом 40%, частично растворим в маслах [9].

Вспомогательные вещества и растворители: желатин пищевой марки П-11 (ООО ТД «ХИММЕД»), глицерин (ч.д.а., ООО «АЛЬДОСА», кат. № 01.0.0.0208.02), алюминий хлористый 6-водный (квалификации ВР/USP, ООО «АЛЬДОСА», кат. № 01.0.8.0007.07), кальций хлористый безводный (ч., ООО «АЛЬДОСА», кат. № 01.0.0.0451.07), этилацетат (х.ч., ООО «АЛЬДОСА», кат. № 01.0.3.0610.02), уксусная кислота ледяная (х.ч., ООО «АЛЬДОСА», кат. № 01.1.8.0620.02), масло вазелиновое (ФС.2.2.0004.15), масло терпентинное эфирное очищенное (ЛСР-002305/07, ФС.3.4.0014.18), вода очищенная (ФС 2.2.0020.18), спирт этиловый 96% (ФС 2.1.0036.15).

При получении микрокапсул использовали верхнеприводную мешалку RW 20 digital (IKA), вакуумный сушильный шкаф СНВС-25/3,5М (ООО «Тула-Терм»). Для определения потери в массе при высушивании объектов использовали анализатор влажности ML-50 (AND)³. Определение

¹ Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

² ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. М.; 1990.

³ ОФС.1.5.3.0007.15 Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 2. М.; 2018.

сыпучести проводили по скорости истечения из воронки с диаметром 10 мм⁴. Определение визуальных характеристик частиц проводили с использованием микроскопа цифрового МИКМЕД LCD 1000X 2.0L (АО «ЛОМО»). Распределение частиц по размеру оценивали с использованием лазерного анализатора размера частиц Bettersizer SD (Bettersize)⁵. Количественное определение суммы фенольных соединений осуществляли на спектрофотометре Cary 100 Scan (Varian). Качественный анализ проводили методом тонкослойной хроматографии, пластинки Polyamide 11 F254 (Merck, кат. № 5557) размером 20×20 см в системе растворителей: этилацетат – концентрированная уксусная кислота – вода в объемном соотношении 5:1:1. В качестве образца сравнения использовали розмариновую кислоту (96%, Sigma-Aldrich, кат. № 536954).

При обработке полученных в ходе экспериментов результатов применяли метод вариационно-статистического анализа с оценкой значимости различий по критерию Стьюдента⁶.

Результаты и обсуждение

Для микрокапсулирования сухого экстракта травы зюзника европейского был выбран метод диспергирования. Выбор проведен с учетом физико-химических свойств субстанции, доступности способа получения микрокапсул, простоты аппаратного оформления и высокой производительности метода. Технологический процесс по методу диспергирования предполагает несколько этапов. На первом этапе получают раствор, содержащий пленкообразователь и активную действующую субстанцию (дисперсная фаза). На втором этапе при добавлении гидрофобной жидкости (дисперсионная среда – вазелиновое масло) образуются мягкие микрочастицы. На третьем этапе частицам придается упругость – при изменении температурного режима (охлаждение системы) затвердевает пленкообразующий материал.

Наиболее сложным является этап получения дисперсионной системы, для проведения которого важен выбор температурного режима, соотношения фазы и среды, скорости оборотов мешалки. Выбор условий для осуществления инкапсулирования на следующем этапе

индивидуален и зависит не только от физико-химических свойств сухого экстракта и вспомогательных веществ, но и от используемых растворителей, а также ожидаемых формы и размера частиц, получаемых в результате инкапсулирования [10].

Для получения микрокапсул методом диспергирования в качестве пленкообразователя выбран желатин. Оптимальная концентрация желатина для предложенной технологии составляет 35–50% и зависит от формы выпуска желатина (порошок, гранулы, пластины), марки желатина и силы (прочности) геля желатина, которая определяется по методу Блюма⁷ и находится в пределах от 180 до 220 единиц. Если сила (прочность) геля используемого желатина менее 180 единиц, то сформированные микрочастицы могут слипаться на стадии охлаждения, что не позволит получить частицы размером менее 500 мкм. Если сила (прочность) геля используемого желатина выше 220 единиц, то процесс диспергирования осложнен неспособностью раствора к диспергированию при необходимой для получения микрочастиц температуре. Таким образом, для получения микрокапсул экстракта зюзника европейского был выбран желатин марки П-11.

В ходе эксперимента был разработан способ введения в липофильную среду сухого экстракта травы зюзника европейского – с предварительным растворением экстракта в растворе пленкообразователя – желатина. Полученную систему, содержащую экстракт и вспомогательные вещества, диспергировали с использованием мешалки (600 rpm, 50 °С) в присутствии масла вазелинового с последующим охлаждением системы до 0 °С. После охлаждения полученные частицы освобождали от дисперсионной среды и высушивали при температуре 35 °С в вакуумном сушильном шкафу. Технологическая схема получения микрокапсул представлена на *рисунке 1*.

Оценку качества полученных микрокапсул проводили по следующим показателям⁸: размер частиц, форма частиц, влажность, качественный анализ, угол естественного откоса, сыпучесть, насыпная плотность. Полученные результаты представлены в *таблице 1*.

⁴ ОФС.1.4.2.0016.15 Степень сыпучести порошков. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 2. М.; 2018.

⁵ ОФС.1.2.1.0008.15 Определение распределения частиц по размеру методом лазерной дифракции света. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 1. М.; 2018.

⁶ ОФС.1.1.0013.15 Статистическая обработка результатов химического эксперимента. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 1. М.; 2018.

⁷ ГОСТ 11293-2017 Желатин. Технические условия. М.; 2020.

⁸ ОФС.1.4.1.0010.15 Порошки. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 2. М.; 2018.

ОФС.1.4.1.0021.15 Экстракты. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 2. М.; 2018.

Рисунок подготовлен авторами / The figure is prepared by the authors

Рис. 1. Технологическая схема получения микрокапсул сухого экстракта травы эюзника европейского методом диспергирования. Кт – контроль технологический, Кх – контроль химический

Fig. 1. Process flow diagram for the production of microcapsules of *Lycopus europaeus* herb dry extract by dispersion. Тс, technological control; Сс, chemical control

Эффективность инкапсулирования ($\mathcal{E}_u$, %) определяли на основании результатов спектрофотометрического анализа суммы фенольных соединений в пересчете на розмариновую кислоту и рассчитывали по формуле:

$$\mathcal{E}_u = \frac{X_0 - X}{X_0}, \quad (1)$$

где X_0 – количество введенного в систему экстракта, X – потери.

Таблица 1. Физико-химические характеристики сухого экстракта травы зюзника европейского и микрокапсул экстракта**Table 1.** Physicochemical properties of *Lycopus europaeus* herb dry extract and dry extract microcapsules

Характеристика <i>Property</i>	Сухой экстракт <i>Dry extract</i>	Микрокапсулы экстракта <i>Dry extract microcapsules</i>
Размер частиц, мкм <i>Particle size, μm</i>	10–100	50–300
Форма частиц <i>Particle shape</i>	Пластины, параллелепипеды, овалы с неровными краями и бугристой поверхностью <i>Plates, parallelepipeds, and ovals with uneven edges and bumpy surfaces</i>	Сферическая с гладкой поверхностью <i>Spheres with smooth surfaces</i>
Влажность, % <i>Moisture, %</i>	4,87±0,23	3,21±0,12
Качественный анализ (ТСХ) <i>Identification (TLC)</i>	В сравнении с пятном розмариновой кислоты (R_f 0,33) <i>Corresponds to the spot obtained with the rosmarinic acid standard (R_f 0,33)</i>	В сравнении с пятном розмариновой кислоты (R_f 0,33) <i>Corresponds to the spot obtained with the rosmarinic acid standard (R_f 0,33)</i>
Угол естественного откоса, град. <i>Angle of repose, deg.</i>	38±2	32±1
Сыпучесть (10 мм), г/с <i>Flow through an orifice (10 mm), g/s</i>	0,00	5,24±0,21
Сыпучесть (10 мм) в режиме вибрации, г/с <i>Flow through an orifice (10 mm) with vibration, g/s</i>	5,00±0,20	5,78±0,17
Сыпучесть (15 мм), г/с <i>Flow through an orifice (15 mm), g/s</i>	0,00	10,53±0,23
Сыпучесть (15 мм) в режиме вибрации, г/с <i>Flow through an orifice (15 mm) with vibration, g/s</i>	4,20±0,20	20,45±0,27
Насыпная плотность, г/мл до уплотнения <i>Bulk density, g/mL before compaction</i>	0,6590±0,0140	0,5496±0,0161
Насыпная плотность, г/мл после уплотнения <i>Tapped density, g/mL</i>	0,7890±0,0200	0,6438±0,0055

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Методом диспергирования были получены микрочастицы диаметром 50–300 мкм, сферической формы с гладкой поверхностью (рис. 2).

Рассчитанная по формуле (1) эффективность инкапсулирования составила 95,0±1,3% при влажности микрочастиц – 3,21±0,12%. Для исследования

Фотография выполнена авторами / The photograph is taken by the authors

Рис. 2. Фотография микрокапсул сухого экстракта травы зюзника европейского при различном увеличении**Fig. 2.** Microcapsules of *Lycopus europaeus* herb dry extract photographed at different magnifications

качественного состава полученных микрокапсул на линию старта хроматографической пластинки наносили 40 мкл спиртового извлечения сухого экстракта травы зюзника европейского 1%, 5 мкл спиртового раствора розмариновой кислоты 0,1% и 40 мкл спиртового извлечения микрокапсул сухого экстракта травы зюзника европейского 3%. На хроматограмме испытуемого раствора в ультрафиолетовом свете наблюдали светло-голубую зону адсорбции с R_f около 0,33,

соответствующую аналогичной зоне адсорбции раствора розмариновой кислоты (рис. 3).

На рисунке 4 представлены интегральные кривые, отображающие распределение частиц экстракта по размерам. Средний размер частиц в образце сухого экстракта (D50) в соответствии с результатами проведенного исследования составил 65,1 мкм, для микрокапсулированной формы сухого экстракта D50 = 140,7 мкм. Полученные данные

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure is prepared by the authors using their own data

Рис. 3. Хроматограмма (а) экстракта травы зюзника европейского в ультрафиолетовом свете и схема хроматограммы (b): 1 – сухой экстракт травы зюзника европейского; 2 – стандартный образец розмариновой кислоты; 3 – микрокапсулы сухого экстракта травы зюзника европейского

Fig. 3. Chromatogram of *Lycopus europaeus* herb dry extract (1), rosmarinic acid standard (2), and microcapsules of *Lycopus europaeus* herb dry extract (3) in UV light (a) and as a scheme (b)

Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure is prepared by the authors using their own data

Рис. 4. Интегральное распределение частиц сухого экстракта травы зюзника европейского (1) и его микрокапсулированной формы (2) по размеру. D10, D50, D90 – размер частиц (мкм), соответствующий объемной доле 10, 50, 90% соответственно

Fig. 4. Cumulative curves of particle size distribution of *Lycopus europaeus* herb dry extract (1) and its microencapsulated form (2). D10, D50, and D90 are particle sizes (μm) corresponding to a volume fraction of 10, 50, and 90%, respectively

подтверждают, что для микрокапсулированной формы сухого экстракта характерны более крупные однородные по форме частицы, чем для некапсулированного сухого экстракта, содержащего значительную долю пылевой фракции (твердые частицы различной формы размером < 50 мкм).

В результате проведенного сравнительного анализа показано, что микрокапсулы экстракта травы зюзника европейского имеют сферическую форму, гладкую поверхность, обладают хорошей сыпучестью и значительно отличаются по своим технологическим характеристикам (табл. 1, рис. 4) от сухого экстракта. Преимуществами микрокапсулированной формы экстракта являются его технологичность в процессе получения лекарственных препаратов и отсутствие гигроскопичности, свойственной субстанции растительного происхождения.

Заключение

Методом диспергирования получены микрочастицы сухого экстракта травы зюзника европейского, в качестве вспомогательного вещества использован желатин марки П-11. Проведена оценка качества полученных микрокапсул по следующим показателям: размер и форма микрочастиц, подлинность (методом тонкослойной хроматографии), эффективность инкапсулирования, влажность, угол естественного откоса, сыпучесть, насыпная плотность. Микрокапсулы экстракта представляют собой однородные частицы размером 50–300 мкм с влажностью $3,21 \pm 0,12\%$, хорошей сыпучестью. Эффективность инкапсулирования при использовании метода диспергирования достигает $95,0 \pm 1,3\%$, что позволяет сделать вывод о возможности использования разработанной технологии для получения микрокапсулированных лекарственных препаратов растительного происхождения.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Jitäreanu A, Trifan A, Vieriu M, Caba I-C, Mârțu I, Agoroaei L. Current trends in toxicity assessment of herbal medicines: a narrative review. *Processes*. 2023;11(1):83. <https://doi.org/10.3390/pr11010083>
- Крепкова ЛВ, Бабенко АН, Лемясева СВ, Боровкова МВ, Кузина ОС. Некоторые аспекты доклинического изучения безопасности зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.) экстракта сухого. *Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии*. 2020;23(8):40–7. Krepkova LV, Babenko AN, Lemyaseva SV, Borovkova MV, Kuzina OS. Some aspects of pre-clinical study of safety of the *Lycopus europaeus* L. dry extract. *Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry*. 2020;23(8):40–7 (In Russ.). <https://doi.org/10.29296/25877313-2020-08-06>
- Лупанова ИА, Крепкова ЛВ, Ферубко ЕВ, Трумпле ТЕ, Бортникова ВВ, Бабенко АН и др. *Новые лекарственные средства растительного происхождения ВИЛАР*. М.: ФГБНУ ВИЛАР; 2021. Lupanova IA, Krepkova LV, Ferubko EV, Trumpe TE, Bortnikova VV, Babenko AN, et al. *New herbal medicines of VILAR*. Moscow: FGBNU VILAR; 2021 (In Russ.). EDN: [DJSFKW](https://doi.org/10.29296/25877313-2021-05-01)
- Кузина ОС, Боровкова МВ, Крепкова ЛВ. Токсикологическая характеристика зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.) и зюзника высокого (*Lycopus exaltatus* L.) травы экстрактов сухих в условиях «острого» опыта. В кн.: *Сборник трудов II Международной научной конференции «Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства»*. М.; 2019. С. 131–5. Kuzina OS, Borovkova MV, Krepkova LV. Toxicological characterization of the *Lycopus europaeus* L. and *Lycopus exaltatus* L. dry extracts in the acute experience. In: *Collection of proceedings of the II International Scientific Conference "Role of metabolomics in improving biotechnological means of production"*. Moscow; 2019. P. 131–5 (In Russ.). EDN: [ECOZXM](https://doi.org/10.30906/0023-1134-2019-53-6-38-41)
- Автина НВ, Писарев ДИ, Новиков ОО, Томчаковская ЕА, Безменова МД. Разработка состава и технологии микрокапсул с экстрактом черемухи поздней. *Современные проблемы науки и образования*. 2012;(4):304. Avtina NV, Pisarev DI, Novikov OO, Tomchakovskaya EA, Bezmenova MD. Development of technology microcapsules with an extract of *Padus serotina*. *Modern Problems of Science and Education*. 2012;(4):304 (In Russ.). EDN: [PBITLF](https://doi.org/10.52101/9785870191058_357)
- Белошапкина ОМ, Семкина ОА. Разработка технологии получения микрокапсул сухого экстракта травы зюзника европейского (*Lycopus europaeus* L.). В кн.: *Сборник трудов X Международной научно-практической конференции молодых ученых «Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения»*. Москва; 2022. С. 357–60. Beloshapkina OM, Semkina OA. Development of technology for obtaining microcapsules of dry herbal extract of *Lycopus europaeus*. In: *Proceedings of X International Scientific Conference of Young Scientists "Current trends in the development of healthcare technologies"*. Moscow; 2022. P. 357–60 (In Russ.). https://doi.org/10.52101/9785870191058_357
- Семкина ОА, Джавахян МА, Белошапкина ОМ, Громакова АИ. Технологические аспекты получения микрокапсул субстанций растительного происхождения. *Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии*. 2021;24(5):5–14. Semkina OA, Dzhavakhyan MA, Beloshapkina OM, Gromakova AI. Technological aspects of obtaining microcapsules of plant origin substances. *Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry*. 2021;24(5):5–14 (In Russ.). <https://doi.org/10.29296/25877313-2021-05-01>
- Garg A, Chhipa K, Kumar L. Microencapsulation techniques in pharmaceutical formulation. *Eur J Pharm Med Res*. 2018;5(3):199–206.
- Семкина ОА, Зверева ВИ, Джавахян МА, Хомик АС. Физико-химические и технологические характеристики зюзника европейского травы экстракта сухого и композиции на его основе. *Химико-фармацевтический журнал*. 2019;53(6):38–41. <https://doi.org/10.30906/0023-1134-2019-53-6-38-41> Semkina OA, Zvereva VI, Dzhavakhyan MA, Khomik AS.

Studying the physicochemical and technological characteristics of dry extract from *Lycopus europaeus* L. herbs and related compositions. *Pharmaceutical Chemistry Journal*. 2019;53(6):550–2

<https://doi.org/10.1007/s11094-019-02036-6>

10. Семкина ОА, Джавахян МА, Белошапкина ОМ, Борисенко ЕВ, Сидельников НИ. Способ инкапсуляции сухих

растительных экстрактов. Патент Российской Федерации № 2782431; 2022.

Semkina OA, Dzhavakhyan MA, Beloshapkina OM, Borisenko EV, Sidelnikov NI. Encapsulation method for dry plant extracts. Patent of the Russian Federation No. 2782431; 2022 (In Russ.).

EDN: [TBPPKX](#)

Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: *О.А. Семкина* – концепция работы, интерпретация и критический пересмотр содержания и результатов работы, ответственность за все аспекты работы, написание текста рукописи, утверждение окончательного варианта статьи для публикации; *О.М. Белошапкина* – концепция работы, поиск и анализ источников литературы, получение микрокапсул и контроль их качества, интерпретация результатов.

Authors' contributions. All the authors confirm that they meet ICMJE criteria for authorship. The most significant contributions were as follows. *Olga A. Semkina* conceptualised the study, interpreted and critically reviewed the manuscript and study results, agreed to be accountable for all aspects of the work, and approved the final version of the manuscript for publication. *Olga M. Beloshapkina* conceptualised the study, searched and analysed literature sources, produced microcapsules, controlled their quality, and interpreted the study results.

ОБ АВТОРАХ / AUTHORS

Семкина Ольга Александровна, канд. фарм. наук

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2611-4490>

semkina@vilarnii.ru

Белошапкина Ольга Михайловна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1743-1176>

olga.beloshap@mail.ru

Поступила 24.08.2023

После доработки 12.10.2023

Принята к публикации 23.11.2023

Online first 26.12.2023

Olga A. Semkina, Cand. Sci. (Pharm.)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2611-4490>

semkina@vilarnii.ru

Olga M. Beloshapkina

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1743-1176>

olga.beloshap@mail.ru

Received 24 August 2023

Revised 12 October 2023

Accepted 23 November 2023

Online first 26 December 2023