Никонова Ю.А., Аббасова С.Г., Каргополова П.Е., Стрижакова О.М., Лягоскин И.В., Васильев А.П., Першин А.С. Валидация методики оценки биологической активности лекарственного препарата на основе тоцилизумаба...

https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-14-3-317-329-table2

Таблица 2. Средние значения относительной специфической активности и коэффициенты вариации, полученные двумя аналитиками в тесте «воспроизводимость между днями»

Table 2. Mean relative potency values and coefficients of variation obtained by two analysts on different days

Определяемая величина Measurand	Результат анализа, % Test result, %				
$RP_{RP_{theor}}^{reop}$	60	80	100	120	140
Аналитик 1 Analyst 1					
RP _{найд} ±SD RP _{found} ±SD	65±2,5	89±6,2	106±2,6	125±10,1	145±15,9
CV_{RP}	3,9	7,0	2,5	8,0	11,0
Аналитик 2 <i>Analyst 2</i>					
RP _{найд} ±SD RP _{found} ±SD	86±12	101±1	95±6	103±3	104±3
$CV_{_{ m RP}}$	14,0	1,4	6,7	3,3	2,5

Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors

Примечание. $RP_{_{meop}}$ и $RP_{_{naūd}}$ — теоретическое и найденное среднее значение относительной специфической активности соответственно, SD — стандартное отклонение, $CV_{_{RP}}$ — коэффициент вариаций значений RP.

Note. RP_{theor} theoretical relative potency; RP_{found} found relative potency; SD, standard deviation; CV_{RP} coefficient of variation for relative potency values.