

<https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-650-fig6>




Рисунок подготовлен авторами по собственным данным / The figure is prepared by the authors using their own data

Рис. 6. Количество GFAP-позитивных астроцитов коры головного мозга мышей после иммуногистохимического окрашивания в эксперименте с различными дозами ГКП. Группы животных с введением ГКП: а – 150×10^3 кл./мышь, б – 50×10^3 кл./мышь, с – 15×10^3 кл./мышь, д – группа контроля. ГКП – глиальные клетки-предшественники, GFAP – глиальный фибриллярный кислый белок, DAPI – 4,6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид, MERGE – совмещение каналов GFAP и DAPI

Fig. 6. Quantity of GFAP-positive astrocytes in the cerebral cortex of mice after immunohistochemical staining in experiments with GPC administration at different doses: a, GPCs at a dose of 150×10^3 cells/mouse; b, GPCs at a dose of 50×10^3 cells/mouse; c, GPCs at a dose of 15×10^3 cells/mouse; d, control group. GPCs, glial progenitor cells; GFAP, glial fibrillary acidic protein; DAPI, 4,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; MERGE, merged GFAP and DAPI channels